

Актуальность

- Коморбидные органические психические расстройства могут усиливать выраженность когнитивных нарушений и затруднять адаптацию.
- При сочетании ПТСР и органической патологии предполагается более выраженное нарушение когнитивных функций
- Выявление нейрокогнитивных профилей важно для дифференциальной диагностики, и выбора терапии.

Цель исследования

- Сравнить нейрокогнитивные особенности комбатантов с ПТСР при различных вариантах коморбидности (депрессия, органические заболевания головного мозга) в сопоставлении с изолированным ПТСР и здоровым контролем.

Методы

Выборка

- 54 комбатанта с ПТСР
- 22 здоровых лица

Нейрокогнитивная оценка

- Тест Струпа
- Go/No-Go
- «Заучивание 10 слов»

Статистика

- Непараметрические методы
- Критерий Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса, post-hoc
- $p \leq 0,05$

Характеристика выборки

Структура выборки

N = 76

Здоровые лица (n=22)
37лет (31; 46)

Изолированное ПТСР (n=17)
36 лет (27; 40)

ПТСР + депрессия (n=17)
36 лет (28; 44)

ПТСР + органическая патология(n=20)
38 лет (35; 48)

Критерии включения

- Личное участие в боевых действиях
- ПТСР (рубрика F43 МКБ-10)
- Коморбидные психические расстройства (F0, F1, F3, F6).

Критерии исключения

- Возраст <18 или >60 лет
- Декомпенсированные соматические заболевания
- Шизофрения, деменция, умственная отсталость

Заключение

Когнитивная гибкость (Тест Струпа)

45

58,5

69

68,5

Интерференционная проба

1,5

3

Количество ошибок

↑ Коморбидность с органической патологией и депрессией сопровождается повышением когнитивной ригидности и увеличением времени выполнения задач

Ингибиторный контроль (Go/No-Go)

0,5

4,5

3

2,5

Ошибка комиссии No-Go (импульсивность)

0,5

2

4

2,5

Ошибка пропуска Go (замедление)

↑ При изолированном ПТСР — импульсивность и дефицит тормозного контроля; при депрессии — замедление реакций

Слухоречевая память (непосредственное воспроизведение)

5

4,5

5

4

1-е предъявление (обучаемость)

8,5

7,5

7,5

6

5-е предъявление (обучаемость)

↓ Коморбидность с органической патологией ассоциирована с нарушением обучаемости

Слухоречевая память (отсроченное воспроизведение)

8

6

6

2,5

Отсроченное воспроизведение

↓ Коморбидность с органической патологией ассоциирована с нарушением консолидации памяти

Результаты и обсуждение

1 Органическая коморбидность

Связана с выраженными нарушениями когнитивной гибкости и слуховой памяти

2 Изолированное ПТСР

Характеризуется преимущественным дефицитом тормозного контроля и повышенной импульсивностью

3 Коморбидная депрессия

Связана с замедлением психомоторных реакций и повышением когнитивной ригидности

4 Нейрокогнитивный профиль

может использоваться как инструмент дифференциальной диагностики коморбидной патологии при ПТСР

Работа проведена в рамках выполнения гранта РНФ 26-15-00168 «Поиск нейробиологических маркеров индивидуальной организации нейропластических и когнитивных процессов и их вклад в патогенетические механизмы психических расстройств, связанных с боевым стрессом»